ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

796002 R3

Equilis®

PREQUENZA TE

ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΓΙΑ ΙΠΠΟΥΣ

1. Ονομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος

Equilis® Prequenza Te ενέσιμο εναιώρημα για ίππους

2. Σύνθεση

Κάθε δόση (1 ml) περιέχει:

Δραστικά συστατικά

Στελέχη του ιού της γρίπης των ιπποειδών:

A/equine-2/ South Africa/4/03	50 AU[1]
A/equine-2/ Newmarket/2/93	50 AU
Ανατοξίνη τετάνου	40 Lf[2]

[1] Αντιγονικές μονάδες ELISA

[2] Ισοδύναμα κροκίδωσης· αντιστοιχεί με ≥ 30 IU/ml ορού ινδόχοιρου στη δοκιμή δραστικότητας της Ευρ. Φαρμ.

Ανοσοενισχυτικές ουσίες:

Iscom Matrix περιέχει:

Purified saponin	375 µg
Cholesterol	125 µg
Phosphatidylcholine	62,5 µg

Διαυγές, ιριδίζον εναιώρημα.

3. Είδη ζώων

Ίπποι.

4. Θεραπευτικές ενδείξεις

Ενεργητική ανοσοποίηση των ίππων από την ηλικία των 6 μηνών κατά της γρίπης των ιπποειδών με σκοπό τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων και της απέκκρισης του ιού μετά από τη λοίμωξη και ενεργητική ανοσοποίηση κατά του τετάνου με σκοπό την πρόληψη της θνησιμότητας.

Γρίπη

Εγκατάσταση ανοσίας:	2 εβδομάδες μετά από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιακού σχήματος.
Διάρκεια ανοσίας:	5 μήνες μετά από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιακού σχήματος, 1 έτος μετά από τον πρώτο επανεμβολιασμό.

Τέτανος

Εγκατάσταση ανοσίας:	2 εβδομάδες μετά από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιακού σχήματος.
Διάρκεια ανοσίας:	17 μήνες μετά από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιακού σχήματος, 2 έτη μετά από τον πρώτο επανεμβολιασμό.

5. Αντενδείξεις

Καμία.

6. Ειδικές προειδοποιήσεις

Ειδικές προειδοποιήσεις:

Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την ασφαλή χρήση στα είδη ζώων:

Οι πώλοι δεν πρέπει να εμβολιάζονται πριν από την ηλικία των 6 μηνών, ειδικά όταν προέρχονται από φορβάδες που είχαν επανεμβολιασθεί κατά τους δύο τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης, λόγω πιθανής αλληλεπίδρασης με τα μητρικά αντισώματα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Σε περίπτωση που κατά λάθος κάνετε αυτοένεση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

Εγκυμοσύνη και γαλουχία:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:

Είναι διαθέσιμες μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, οι οποίες αποδεικνύουν ότι το εν λόγω εμβόλιο δύναται να χορηγείται την ίδια ημέρα χωρίς να αναμειγνύεται με τον Αντιπετανικό ορό της Intervet (ανατρέξτε στην παράγραφο: «Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδοί χορήγησης»).

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από την ταυτόχρονη χρήση του εν λόγω εμβολίου με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρμακο εκτός του προϊόντος που αναφέρεται παραπάνω. Η απόφαση για τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμάκου, πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

Υπερδοσολογία:

Μετά από τη χορήγηση διπλάσιας δόσης του εμβολίου, δεν παρατηρήθηκαν άλλες παρενέργειες εκτός όσων περιγράφονται στην παράγραφο «Ανεπιθύμητα συμβάντα», εκτός από ελαφριά κατάπτωση την ημέρα του εμβολιασμού.

Κύριες ασυμβατότητες:

Να μην αναμειγνύεται με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

7. Ανεπιθύμητα συμβάντα

Ίπποι:

Σπάνια (1 έως 10 ζώα / 10.000 υπό θεραπεία ζώα):	Διόγκωση στο σημείο της ένεσης[1], Πόνος στο σημείο της ένεσης[2].
Πολύ σπάνια (<1 ζώο / 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων αναφορών):	Πυρετός[3], Λήθαργος[3], Ανορεξία[3], Αντίδραση υπερευαισθησίας[4].

[1] Μία διάχυτη σκληρή ή μαλακή διόγκωση (μέγιστης διαμέτρου 5 cm), η οποία υποχωρεί εντός 2 ημερών. Μία τοπική αντίδραση που υπερβαίνει τα 5 cm και πιθανώς να παραμείνει για περισσότερες από 2 ημέρες είναι δυνατόν να εμφανιστεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

[2] Πόνος στο σημείο της ένεσης, ο οποίος πιθανώς να οδηγήσει σε προσωρινή λειτουργική δυσφορία (δυσκαμψία).

[3] Πυρετός, ο οποίος μερικές φορές συνοδεύεται από λήθαργο και ανορεξία, είναι δυνατόν να εμφανιστεί για 1 ημέρα, και έως 3 ημέρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

[4] Συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας (μερικές φορές θανατηφόρα). Εάν εμφανιστεί μια τέτοια αντίδραση, πρέπει να χορηγείται χωρίς καθυστέρηση η ενδεδειγμένη θεραπεία.

Η αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας ενός προϊόντος. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης ή αμφιβάλλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε, καταρχάς, με τον κτηνίατρό σας. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητα συμβάντα στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος αυτού του φύλλου οδηγιών χρήσης, ή μέσω του εθνικού σας συστήματος αναφοράς.

Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040213
e-mail: vetpharmacovigilance@eof.gr
Ιστότοπος:
http://www.eof.gr

Κύπρος
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
1417, Λευκωσία, Κύπρος
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf

8. Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδοί χορήγησης

Μία δόση (1 ml). Ενδομυϊκή χρήση.

Εμβολιακό πρόγραμμα:

Αρχικό εμβολιακό σχήμα

Χορηγήστε μία δόση (1 ml), με ενδομυϊκή ένεση, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

- Αρχικό εμβολιακό σχήμα: η πρώτη ένεση από την ηλικία των 6 μηνών, η δεύτερη ένεση 4 εβδομάδες αργότερα.

Επανεμβολιασμός

Γρίπη

Μόνο σε ίππους που έχουν ήδη ολοκληρώσει το αρχικό εμβολιακό σχήμα συνιστάται η χορήγηση μίας μόνο επαναληπτικής δόσης, με τη χρήση εμβολίων που περιέχουν τους ίδιους τύπους του ιού της γρίπης των ιπποειδών, οι οποίοι περιέχονται στο εν λόγω εμβόλιο. Είναι πιθανόν να θεωρηθεί απαραίτητη η χορήγηση του αρχικού εμβολιακού σχήματος σε ίππους, οι οποίοι δεν έχουν λάβει κατάλληλα τον αρχικό εμβολιασμό.

Ο πρώτος επανεμβολιασμός (τρίτη δόση) κατά της γρίπης των ιπποειδών χορηγείται 5 μήνες μετά από το αρχικό εμβολιακό σχήμα. Αυτός ο επανεμβολιασμός οδηγεί σε ανοσία κατά της γρίπης των ιπποειδών που διαρκεί τουλάχιστον 12 μήνες.

Ο δεύτερος επανεμβολιασμός χορηγείται 12 μήνες μετά από τον πρώτο επανεμβολιασμό.

Η εναλλασσόμενη χορήγηση, με μεσοδιάστημα 12 μηνών, ενός κατάλληλου εμβολίου κατά της γρίπης των ιπποειδών, που περιέχει τα στελέχη A/equine-2/ South Africa/4/03 και A/equine-2/Newmarket-2/93, συνιστάται για τη διατήρηση της ανοσίας κατά της γρίπης των ιπποειδών (δείτε το σχεδιάγραμμα).

Τέτανος

Ο πρώτος επανεμβολιασμός χορηγείται το αργότερο 17 μήνες μετά από το αρχικό εμβολιακό σχήμα. Στη συνέχεια συνιστάται μέγιστο μεσοδιάστημα δύο ετών (δείτε το σχεδιάγραμμα).



Σε περίπτωση αυξημένου κινδύνου λοίμωξης ή ανεπαρκούς πρόσληψης πρωτογάλατος, μπορεί να χορηγηθεί επιπρόσθετα μία αρχική ένεση στην ηλικία των 4 μηνών, ακολουθούμενη από το πλήρες εμβολιακό πρόγραμμα (Αρχικό εμβολιακό σχήμα στην ηλικία των 6 μηνών και 4 εβδομάδες αργότερα).

Σύγχρονη ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση (κατεπείγων εμβολιασμός)

Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί μαζί με τον Αντιπετανικό ορό της Intervet για τη θεραπεία τραυματισμένων ίππων που δεν έχουν ανοσοποιηθεί κατά του τετάνου. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη δόση (V1) του εμβολίου μπορεί να χορηγηθεί συγχρόνως με την κατάλληλη προφυλακτική δόση του Αντιπετανικού ορού της Intervet σε διαφορετικό σημείο ένεσης, χρησιμοποιώντας διαφορετικές σύριγγες και βελόνες. Αυτό οδηγεί σε παθητική προστασία κατά του τετάνου που διαρκεί τουλάχιστον 21 ημέρες μετά από τη σύγχρονη χορήγηση. Η δεύτερη δόση του εμβολίου (V2) πρέπει να χορηγηθεί 4 εβδομάδες αργότερα. Πρέπει να επαναληφθεί ένας τρίτος εμβολιασμός με το Equilis Prequenza Te τουλάχιστον μετά από τέσσερις εβδομάδες. Η σύγχρονη χορήγηση του Equilis Prequenza Te και του Αντιπετανικού ορού της Intervet είναι δυνατό να μειώσει την ενεργητική ανοσία κατά του τετάνου, σε σύγκριση με ίππους που εμβολιάσθηκαν με το Equilis Prequenza Te χωρίς ορό αντιποξίνης τετάνου.

9. Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση

Αφήστε το εμβόλιο να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.

10. Χρόνοι αναμονής

Μηδέν ημέρες.

11. Ειδικές συνθήκες διατήρησης

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να φυλάσσεται σε ψυγείο (2 °C – 8 °C).
Να μην καταψύχεται.
Να φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα μετά το Exp. Η ημερομηνία λήξεως συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα.

12. Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.

Χρησιμοποιήστε προγράμματα επιστροφής φαρμάκων για την απόρριψη μη χρησιμοποιηθέντων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ή άλλων υλικών που

Equilis® Prequenza Te 796002 R3

προέρχονται από τη χρήση τους σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις και με τυχόν ισχύοντα εθνικά συστήματα συλλογής. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων.

13. Ταξινόμηση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Να χορηγείται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

14. Αριθμοί άδειας κυκλοφορίας και συσκευασίες

EU/2/05/057/001-004

Μεγέθη συσκευασίας:

Χάρτινο κουτί με 10 γυάλινα φιαλίδια του 1 ml (1 δόση).
Χάρτινο κουτί με 1, 5 ή 10 προγεμισμένες σύριγγες του 1 ml (1 δόση) με βελόνες.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

15. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών χρήσης

07/2023

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων της ΕΕ για τα κτηνιατρικά προϊόντα (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Στοιχεία επικοινωνίας

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων και στοιχεία επικοινωνίας για την αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Ολλανδία

Ελλάδα
Intervet Hellas A.E
Τηλ: + 30 210 989 7452

Κύπρος
Intervet Hellas A.E
Τηλ: + 30 210 989 7452

MSD Animal Health

Moved to repository by UHLEMAYR 06:Dec:2023 15:14

FOLHETO INFORMATIVO

Equilis®

PREQUENZA TE

SUSPENSÃO INJETÁVEL PARA EQUINOS

1. Nome do medicamento veterinário
Equilis® Prequenza Te suspensão injetável para equinos

2. Composição
Cada dose (1 ml) contém:

Substâncias ativas:

Vírus da influenza equina, estirpes:	
A/equine-2/ South Africa/4/03	50 UA[1]
A/equine-2/ Newmarket/2/93	50 UA
Toxoide tetânico	40 Lf[2]

[1] Unidades ELISA antigénicas

[2] Equivalentes floculação; corresponde a ≥ 30 UI/ml soro de cobaia no teste de potência da Farm. Eur.

Adjuvantes:

Iscom-Matrix contendo:	
Saponina purificada	375 µg
Colesterol	125 µg
Fosfatidilcolina	62,5 µg

Suspensão límpida opalescente.

3. Espécies-alvo
Equinos.

4. Indicações de utilização
Imunização ativa de equinos a partir dos 6 meses de idade contra a influenza equina, com a finalidade de reduzir os sinais clínicos e a excreção do vírus após a infeção, e imunização ativa contra o tétano, para prevenir a mortalidade.

Influenza

Início da imunidade:	2 semanas após a primo-vacinação.
Duração da imunidade:	5 meses após a primo-vacinação, 1 ano após a primeira revacinação.

Tétano

Início da imunidade:	2 semanas após a primo-vacinação.
Duração da imunidade:	17 meses após a primo-vacinação, 2 anos após a primeira revacinação.

5. Contraindicações
Não existentes.

6. Advertências especiais
Advertências especiais:
Vacinar apenas animais saudáveis.

Precauções especiais para a utilização segura nas espécies-alvo:
Devido à possível interferência de anticorpos de origem materna, os poldros não devem ser vacinados antes dos 6 meses de idade, especialmente se forem filhos de éguas que tenham sido revacinadas durante os dois últimos meses de gestação.

Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:
Em caso de autoinjeção acidental, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo.

Gestação e lactação:
Pode ser administrado durante a gestação e a lactação.

Interação com outros medicamentos e outras formas de interação:
Existe informação sobre segurança e eficácia que demonstra que esta vacina pode ser administrada no mesmo dia, mas não misturada com o Tetanus-Serum da Intervet (ver secção "Dosagem em função da espécie, via e modo de administração").

Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando administrada com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com aqueles já referidos. A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso.

Sobredosagem:
Na sequência da administração de uma dose dupla da vacina, não foram observados outros efeitos secundários para além dos descritos na secção "Eventos adversos", com exceção de alguma depressão no dia da vacinação.

Incompatibilidades principais:
Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário.

7. Eventos adversos
Equinos:

Raros (1 a 10 animais / 10 000 animais tratados):	Tumefação no local de injeção[1], Dor no local de injeção[2].
Muito raros (<1 animal / 10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas):	Febre[3], Letargia[3], Inapetência[3], Reação de hipersensibilidade[4].

[1] Tumefação mole ou rija difusa (máx. 5 cm de diâmetro), que desaparece no prazo de 2 dias. Em casos muito raros, pode ocorrer uma reação local que excede os 5 cm e pode persistir durante mais do que 2 dias.
[2] Dor no local de injeção pode resultar em desconforto funcional temporário (rigidez).
[3] Pode ocorrer febre, por vezes acompanhada de letargia e inapetência, durante 1 dia e, em casos excecionais, até 3 dias.
[4] Incluindo anafilaxia (por vezes fatal). Se tal reação ocorrer, deve ser administrado tratamento apropriado de imediato.

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. Caso detete quaisquer efeitos mencionados neste folheto ou outros efeitos mesmo que não mencionados, ou pense que o medicamento veterinário não foi eficaz, informe o seu médico veterinário. Também pode comunicar quaisquer eventos adversos ao titular da Autorização de Introdução no Mercado utilizando os dados de contacto no final deste folheto, ou através do Sistema Nacional de Farmacovigilância Veterinária (SNFV): farmacovigilancia.vet@dgav.pt.

8. Dosagem em função da espécie, via e modo de administração
Uma dose (1 ml). Administração intramuscular.

Programa de vacinação:

Primo-vacinação
Administrar uma dose (1 ml), por injeção intramuscular, de acordo com o esquema seguinte:

- Primo-vacinação: primeira injeção a partir dos 6 meses de idade, segunda injeção 4 semanas mais tarde.

Revacinação
Influenza
É recomendado que seja administrada apenas uma dose na revacinação de equinos que já receberam uma primo-vacinação com vacinas que contêm os mesmos tipos de vírus da influenza equina que os desta vacina. Pode ser considerada necessária uma primo-vacinação em equinos que não foram adequadamente primo-vacinados.

A primeira revacinação (terceira dose) contra a influenza equina é administrada 5 meses após a primo-vacinação. Esta revacinação resulta numa imunidade à influenza equina que se mantém durante pelo menos 12 meses.

A segunda revacinação é administrada 12 meses após a primeira revacinação.

Recomenda-se a utilização alternada, com 12 meses de intervalo, de uma vacina adequada contra a influenza equina, contendo as estirpes A/equine-2/ South Africa/4/03 e A/equine-2/Newmarket-2/93, de modo a que se mantenham os níveis de imunidade contra o componente influenza (ver esquema).

Tétano
O primeiro reforço é administrado não mais de 17 meses depois da primo-vacinação. A partir de então, recomenda-se um intervalo máximo de dois anos (ver esquema).



Nos casos de risco de infeção acrescido, ou quando a ingestão de colostro tenha sido insuficiente, pode ser administrada uma dose inicial adicional aos 4 meses de idade, seguida do programa de vacinação completo (primo-vacinação aos 6 meses de idade e 4 semanas depois).

Imunização ativa e passiva concomitante (vacinação de emergência)
A vacina pode ser utilizada simultaneamente com o Tetanus-Serum da Intervet no tratamento de equinos feridos que não estejam vacinados contra o tétano. Nesse caso, a primeira dose (V1) da vacina pode ser administrada concomitantemente com a dose profilática de Tetanus-Serum da Intervet, num local de injeção separado, utilizando seringas e agulhas diferentes. Desta forma, será obtida uma proteção passiva contra o tétano durante pelo menos 21 dias depois da administração concomitante. A segunda dose da vacina (V2) deverá ser administrada 4 semanas depois. Pode ser realizada uma terceira vacinação com Equilis® Prequenza Te pelo menos quatro semanas mais tarde. A utilização concomitante de Equilis® Prequenza Te e de Tetanus-Serum da Intervet pode reduzir a imunidade ativa contra o tétano, comparativamente com cavalos vacinados com Equilis® Prequenza Te na ausência de soro antitetânico.

9. Instruções com vista a uma administração correta
Permitir que a vacina atinja a temperatura ambiente antes de administrar.

10. Intervalos de segurança
Zero dias.

11. Precauções especiais de conservação
Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar no frigorífico (2 °C – 8 °C).
Não congelar.
Proteger da luz.

Não administrar este medicamento veterinário depois de expirado o prazo de validade indicado no rótulo depois de Exp. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

12. Precauções especiais de eliminação
Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

Utilize regimes de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis. Estas medidas destinam-se a ajudar a proteger o ambiente.
Pergunte ao seu médico veterinário como deve eliminar os medicamentos veterinários que já não são necessários.

13. Classificação dos medicamentos veterinários
Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

14. Números de autorização de introdução no mercado e tamanhos de embalagem
EU/2/05/057/001-004

Apresentações:
Caixa de cartão com 10 frascos de vidro de 1 ml (1 dose).
Caixa de cartão com 1, 5 ou 10 seringas pré-carregadas de 1 ml (1 dose) com agulhas.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

15. Data em que o folheto informativo foi revisto pela última vez
07/2023

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia Union Product Database (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Detalhes de contacto
Titular da Autorização de Introdução no Mercado, fabricante responsável pela libertação do lote e detalhes de contacto para comunicar suspeitas de eventos adversos:
Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Países Baixos

Portugal
Tel: + 351 214 465 700

17. Outras informações

Só pode ser administrado sob controlo do médico veterinário.

MSD Animal Health

Moved to repository by UHLEMAYR 06:Dec:2023 15:14

PSC020504 03 R1 360 x 180 mm Black