

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:**Scalibor®**

Protectorband αντιπαρασιτικό
περιλαίμιο για σκύλους 48 cm

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Intervet International BV
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Intervet International BV
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands

ή

Intervet Productions S.A.
Rue de Lyons
27460 Igoville
France

Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

Intervet Hellas AE, Αγ. Δημητρίου 63, 174 55 Αλιμύς

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Scalibor® Protectorband, αντιπαρασιτικό περιλαίμιο για σκύλους 48 cm

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ένα λευκό περιλαίμιο μήκους 48 cm περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Deltamethrin 0,760 g

Έκδοχα:

Titanium dioxide (E 171) 0,285 g

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Εξυπαρξάται του σκύλου ευαίσθητα στη δελταμεθρίνη:

- πρόληψη της παρασίτωσης από κρότωνες για περίοδο 6 μηνών
- πρόληψη της παρασίτωσης από ψύλλους για περίοδο 4 μηνών
- αντι-νυμφική δράση κατά των ενηλίκων κωνύπων (*Culex pipiens pipiens*) για περίοδο 6 μηνών.

Μία θεραπεία παρέχει εντομοαπωθητική δράση κατά των σκνιπών (*Phlebotomus perniciosus*) για περίοδο 12 μηνών.

Η εντομοαπωθητική δράση (anti-feeding effect) του Scalibor κατά των σκνιπών μειώνει επίσης και τον κίνδυνο μετάδοσης της σπλαχνικής λεϊσμανίωσης στο σκύλο.

Ως εκ τούτου, το Scalibor μπορεί να θεωρηθεί τμήμα ενός προγράμματος πρόληψης της λοίμωξης με *Leishmania infantum*.

Επειδή το προϊόν δεν έχει την κλασική απωθητική δράση κατά των κρότωνων, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί η παρουσία κρότωνων μετά από την εφαρμογή του περιλαΐμιου. Τα παράσιτα αυτά θα πεθάνουν μετά από την έκθεσή τους στο δραστικό συστατικό του περιλαΐμιου που βρίσκεται στο σκύλο. Η πρόσληψη από αυτά τοξική ποσότητα της δραστικής ουσίας έχει ως αποτέλεσμα την υπερδιέγερση, που ακολουθείται από παράλυση και θάνατο. Ως εκ τούτου, είναι απίθανο να φθάσουν οι κρότωνες στο στάδιο της μύζησης αίματος.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους με διαπιστωμένη υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό.

Να μη χρησιμοποιείται σε κυνάρια ηλικίας μικρότερης των 7 εβδομάδων.

Να μη χρησιμοποιείται σε γάτες.

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους με εκτεταμένες δερματικές αλλοιώσεις.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Έχουν αναφερθεί τοπικές δερματικές αντιδράσεις (κνισμός, ερύθημα, απώλεια τριχώματος) που εντοπίζονται στο λαϊμό ή γενικά στο δέρμα, οι οποίες είναι πιθανόν να υποδηλώνουν μια γενικευμένη ή τοπική αντίδραση υπερευαισθησίας σε σπάνιες περιπτώσεις. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχει αναφερθεί αλλαγή της συμπεριφοράς (π.χ. ληθαργικότητα ή υπερκινητικότητα) η οποία συχνά συνδέεται με ερεθισμό του δέρματος.

Έχουν αναφερθεί γαστροεντερικά συμπτώματα, όπως έμετος, διάρροια και υπερέκκριση σιέλου σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

Έχουν αναφερθεί νευρομυϊκές διαταραχές, όπως αταξία και μυϊκός τρόμος σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Τα συμπτώματα συνήθως παρέχονται εντός 48 ωρών μετά από την αφαίρεση του περιλαΐμιου.

Εάν εμφανισθεί οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, το περιλαίμιο πρέπει να αφαιρεθεί. Η θεραπεία πρέπει να είναι συμπτωματική, καθώς δεν υπάρχει γνωστό ειδικό αντίδοτο.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

- πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 υπό θεραπεία ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες)
- συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
- μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
- σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
- πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων αναφορών).

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνιάτρο σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ένα περιλαίμιο ανά σκύλο.

Το περιλαίμιο πρέπει να τοποθετείται στο σκύλο μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από την πιθανή έκθεση των ζώων στο μολυσμένο περιβάλλον, γιατί η πλήρης αποτελεσματικότητά του εκδηλώνεται μετά από μια εβδομάδα.

Συζητήστε η τοποθέτηση του περιλαΐμιου σε όλους τους σκύλους ενός σπιτιού.

Το πλύσιμο του σκύλου δεν επηρεάζει τη δραστηριότητα του περιλαΐμιου.

Το περιλαίμιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυνάρια από την ηλικία των 7 εβδομάδων και άνω.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Προσαρμόστε το περιλαίμιο γύρω από το λαϊμό του σκύλου χωρίς να τον σφίγγετε. Κόψτε το περίσσευμα του περιλαΐμιου σε απόσταση 5 cm από την πόρπη.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΒΙΟΛΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:

Σε περίπτωση εκτεταμένου τοπικού ερεθισμού ή εμφανούς αλλεργικής αντίδρασης, αφαιρέστε αμέσως το περιλαίμιο.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται

από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό

φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα:

Πλένετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και κρύο νερό μετά από την τοποθέτηση του περιλαΐμιου. Μην επιτρέπτε σε παιδιά να παίζουν ή να γλύφουν το περιλαίμιο.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια ή το στόμα.

Εάν το περιλαίμιο έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό.

Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία στη δελταμεθρίνη ή σε ένα ή περισσότερα από τα συστατικά του περιλαΐμιου πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.

Εάν ο ερεθισμός του δέρματος ή των ματιών επιμένει ή εάν κατά λάθος υπάρξει κατάποση, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσεως.

Μην επιτρέπτε στα ζώα στα οποία τοποθετήθηκε το περιλαίμιο, να κοιμούνται σε επαφή με ανθρώπους και ειδικότερα με παιδιά.

Αν και η περιστασιακή επαφή με το νερό δεν μειώνει την αποτελεσματικότητα του περιλαΐμιου, πρέπει να αφαιρείται πριν από το κολύμπι και το πλύσιμο του σκύλου γιατί το δραστικό συστατικό είναι επικίνδυνο για τα ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς. Μην επιτρέπτε στους σκύλους να κολυμπούν στο νερό τις πρώτες πέντε ημέρες μετά από την τοποθέτηση του περιλαΐμιου.

Εγκυμοσύνη και γαλουχία

Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά ανεπιθύμητες ενέργειες σε θηλυκούς σκύλους, οι οποίοι φορούσαν το περιλαίμιο σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. Δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα στα κυνάρια, οι μητέρες των οποίων φορούσαν περιλαίμιο μέχρι το τέλος του θηλασμού.

Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα):

Σε περίπτωση τυχαίας μύσησης και κατάποσης του περιλαΐμιου από το σκύλο, είναι πιθανόν να παρατηρηθούν τα ακόλουθα συμπτώματα: μη συντονισμένες κινήσεις, μυϊκός τρόμος και υπερέκκριση σιέλου. Τα συμπτώματα αυτά παρέχονται μετά από 48 ώρες. Η θεραπεία μπορεί να είναι μόνο συμπτωματική, καθώς δεν είναι γνωστό ειδικό αντίδοτο.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσα των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευθείτε τον κτηνιάτρο σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν είναι επικίνδυνο για τους ιχθείς και άλλους υδρόβιους οργανισμούς. Μην μολύνετε με το προϊόν ή τη συσκευασία του μικρές λίμνες, διαλύματα νερού ή τάφρους.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οκτώβριος 2018

15. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το χρώμα του περιλαΐμιου δεν έχει σχέση με την αποτελεσματικότητά του προϊόντος

Συσκευασία:

1 κουτί το οποίο περιέχει 1 λευκό περιλαίμιο των 48 cm



MSD
Animal Health

