



BYK™

Vitamin E-Selen

Ενέσιμο διάλυμα

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

INTERVET HELLAS ΑΕ

Αγ. Δημητρίου 63, 174 55 Άλιμος, Ελλάδα

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

VetViva Richter GmbH

Austria

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Vitamin E-Selen

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1 ml διαλύματος περιέχει:

Tocopherol acetate 150 mg

Sodium selenite pentahydrate 1,67 mg

(αντιστοιχεί σε 0,5 mg selenium)

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το Vitamin E-Selen ενδείκνυται για την πρόληψη και τη θεραπεία της έλλειψης βιταμίνης Ε ή και της έλλειψης σεληνίου για όλα τα είδη των ζώων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν είναι γνωστές.



Design Information	
Size	105 x 148 mm (DIN A6)
Text column 1	8 pt
Text column 2	8 pt
Packaging No.	34270/G
Font type	Arial, Akzidenz-Grotesk Pro
Colours used	Pantone Black 6 C
PDF Version	1.6
Approval <i>date + signature</i>	



ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν είναι γνωστές.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή, άλογα, χοίροι, αιγοπρόβατα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Άλογα, βοοειδή 10 ml

Χοίροι, χοιρομητέρες 5 - 10 ml

Αιγοπρόβατα, μοσχάρια 3 - 5 ml

Αμνοερίφια, χοιρίδια 1 - 3 ml

Το Vitamin E-Selen ενίεται ενδομυϊκά ή υποδόρια. Σε σοβαρές περιπτώσεις η θεραπεία επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα. Προληπτικά μπορεί να χορηγείται σε διάστημα 3 μηνών.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Το ήπαρ και το σημείο ένεσης δε θα δίνονται για κατανάλωση 7 μέρες μετά το τέλος της θεραπείας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Το Vitamin E-Selen πρέπει να διατηρείται σε δροσερό μέρος και μακριά από το φως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η υπερδοσολογία προκαλεί οξεία σεληνίωση με ταχύ και ασθενή σφυγμό, δύσπνοια, πολουουρία, κολικό και διάρροια. Θεραπεία δεν υπάρχει.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 30439/K-2175/4-12-85

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασίες: Φιάλη 50 ml, 100 ml.

34270G

